



Infoblad

ALVLEESKLIERKANKER

Verloop



VERMOEIDHEID

Vermoeidheid kan ontstaan door kanker en/of de behandeling van kanker. Steeds meer mensen geven aan hiervan last te hebben. Sommigen krijgen enige tijd na de behandeling nog last van (extreme) vermoeidheid. De vermoeidheid kan lang aanhouden. Wanneer de ziekte vergevorderd is, kan de vermoeidheid ook te maken hebben met het voortschrijdende ziekteproces.

VERLOOP VAN DE ZIEKTE

Alvleesklierkanker wordt meestal pas in een laat stadium ontdekt. De klachten die in het beginstadium van de ziekte optreden zijn namelijk erg vaag, zeker als het om een tumor in het middengedeelte of de staart van de alvleesklier gaat. Voor de meeste patiënten met alvleesklierkanker zijn de overlevingskansen daardoor beperkt. De behandeling van alvleesklierkanker is meestal gericht op het verminderen van de klachten, zodat iemand nog enige tijd redelijk kan functioneren.

Als een in opzet curatieve behandeling wel mogelijk is, dan lopen de vooruitzichten daarvan sterk uiteen. Van de patiënten met alvleesklierkanker die een Whipple-operatie hebben ondergaan, overleeft ongeveer 20% de eerste vijf jaar na de operatie. Wat uw vooruitzichten zijn, hangt af van de vorm van alvleesklierkanker die u heeft en van het stadium van uw ziekte.

Overlevingspercentages voor een groep patiënten zijn niet zomaar naar uw individuele situatie te vertalen. Wat uw persoonlijk voor de toekomst mag verwachten, kunt u het beste met uw behandelend arts bespreken.

PWF

| Scharlooweg 52 |

| T: 461 1998 • 461 0108 |

| E: info@spwfcuracao.org |