



Infoblad

BLAASKANKER

Onderzoek voor diagnose

ONDERZOEK VOOR DIAGNOSE

Heeft u symptomen die kunnen passen bij blaaskanker? Ga dan naar uw huisarts. Hij doet meestal een urineonderzoek. Zo nodig verwijst hij u daarna naar een uroloog.

Vermoedt de uroloog dat er sprake is van blaaskanker? Dan kijkt hij de urine na op afwijkende cellen. Ook zal de uroloog de blaas en andere delen van de urinewegen onderzoeken. De arts doet onderzoek naar:

- de **plaats** van de tumor: afwijkende cellen komen meestal uit de blaas, maar soms ook van andere plaatsen in de urinewegen die bekleed zijn met hetzelfde slijmvlies
- de **aard** van de tumor: is het een niet-spierinvasief groeiende of een spierinvasief groeiende tumor.

CYTOSCOPIE

Een cystoscopie is een kijkonderzoek waarbij de specialist de binnenkant van de blaas bekijkt.

Het onderzoek gebeurt met een holle buis of slang waaraan een kleine camera met sterk vergrotende lenzen is bevestigd: een **cystoscoop**.

De uroloog schuift de cystoscoop via de plasbuis tot in de blaasholte. Tijdens het inbrengen bekijkt de uroloog meteen de binnenkant van de plasbuis. Bij mannen is de plasbuis lang en bochtig. Daarom wordt bij hen meestal een flexibele cystoscoop gebruikt. Vrouwen hebben een korte, rechte plasbuis. Daarom kan bij vrouwen ook een niet-buigzame cystoscoop worden gebruikt.

Het onderzoek is niet pijnlijk, maar de meeste mensen vinden het wel onprettig. Om de plasbuis glad en minder gevoelig te maken, wordt eerst een gelei in de plasbuis gespoten. Deze gelei bevat een verdovend middel. Via de cystoscoop wordt de blaas gevuld met steriel vocht zodat de uroloog de blaas goed kan bekijken. U kunt het gevoel hebben dat u moet plassen.

Vaak wordt tijdens een cystoscopie (opnieuw) urine afgenomen. Een patholoog onderzoekt de urine op afwijkende cellen.

DEFINITIEVE DIAGNOSE

Als de uroloog een tumor in de blaas vindt, dan wordt deze verwijderd onder algehele verdoving of met een ruggenprik. De uroloog brengt een dikke, starre buis in de blaas in. Dit heet een **TURT**. Via deze buis wordt een instrument ingebracht om de tumor(en) weg te snijden. Een patholoog onderzoekt het weggenomen weefsel

onder de microscoop.

Hierna kan de arts de definitieve diagnose stellen. Ook kan worden bepaald hoe diep een eventuele tumor in de blaaswand is ingegroeid en hoe agressief de tumor is. Is het blaaskanker, dan is verdere behandeling nodig.

MEER INFORMATIE

U kunt meer informatie vragen in het ziekenhuis waar u wordt onderzocht.



PWF | Scharlooweg 52

|| T: 461 1998 • 461 0108 || E: info@spwfcuraao.org |