



# Infoblad

## BORSTKANKER

### Symptomen

Bepaalde veranderingen in de borst kunnen wijzen op borstkanker. De meest voorkomende verandering is een 'knobbeltje'. Het gaat dan om een verdikking in de borst die anders aanvoelt dan de bobbeligheid die u normaal kunt opmerken.

Knobbeltjes kunnen heel verschillend aanvoelen. Vaak is het een plekje in de borst dat iets stugger of harder is dan de rest van het weefsel. Soms is het kogelrond en glijdt het onder de vingers weg als een knikker. Soms voelt het als een verdikte schijf of een strengetje achter de tepel. Meestal doen dergelijke knobbeltjes geen pijn.

Andere afwijkingen kunnen zijn:

- Deukjes of kuiltjes in de huid.
- Een sinds kort ingetrokken tepel.
- Een verandering van de tepel, zoals roodheid, schilfertjes of een plekje dat op eczeem lijkt.
- Bruin of bloederig vocht uit de tepel.
- Pijn in de borst op een plek waar ook het klierweefsel iets anders aanvoelt. Pijn is op zichzelf geen teken dat er een afwijking in de borst is. Heeft u echter voortdurend pijn in (één van) uw borsten, bespreek dan met uw huisarts of regelmatig onderzoek wenselijk is.
- Een borst die warm aanvoelt en rood is verkleurd. Soms is de huid verdikt en vertoont putjes, zoals een sinaasappelschil.
- Een wondje van de huid dat niet geneest.

### GOED- OF KWAADAARDIG

De genoemde veranderingen in of aan de borst kunnen zowel wijzen op een goedaardige aandoening als op kanker. Alleen medisch onderzoek kan uitwijzen of de verandering goed- of kwaadaardig is.

Daarom is het verstandig bij een van de genoemde veranderingen naar uw huisarts te gaan.



**PWF**

| Scharlooweg 52 |

| T: 461 1998 • 461 0108 |

| E: [info@spwfcuraao.org](mailto:info@spwfcuraao.org) |