



# Infoblad

## PROSTAATKANKER

### Nieuwe behandeling

#### NIEUWE BEHANDELINGEN

De behandeling van prostaatkanker is volop in ontwikkeling. De arts kan u een behandeling voorstellen waarbij hij de prostaat niet verwijdert. Maar wel de tumor behandelt.

Voorbeelden hiervan zijn:

- bevriezing
- HIFU-therapie
- IRE-therapie

De behandelingen zijn meestal in opzet genezend. Soms is het een palliatieve behandeling. U krijgt deze behandeling meestal in het kader van wetenschappelijk onderzoek. U kunt deze behandelingen maar op een aantal plaatsen in Nederland krijgen.

#### BEVRIEZING

Bij bevriezing plaatst de arts een aantal naalden in de prostaat. Hij doet dit via het gebied tussen de balzak en de anus: het perineum. Daarna worden de naalden bevroren. Door de bevriezing van het prostaatweefsel worden de kankercellen gedood. Een ander woord voor bevriezing is cryotherapie. Na de behandelingen verwijdert de arts de naalden. U krijgt voor deze behandeling een verdoving. Weefsels om de prostaat heen kunnen ook beschadigen door de bevriezing. De kans op erectieproblemen na de ingreep is daarom groot. Meestal krijgen de patiënten deze behandeling na een bestraling. Maar het kan ook uw 1e behandeling zijn.



#### HIFU-THERAPIE

Bij de HIFU-therapie brengt de arts via de endeldarm een flexibele buis in de prostaat. Deze buis maakt geluidsgolven die ervoor zorgen dat het prostaatweefsel gaat trillen. Hierdoor ontstaat warmte die de prostaatkankercellen doodt. U krijgt voor deze behandeling een verdoving. Een nadeel van deze methode is dat u klachten krijgt bij het plassen.

#### IRE-BEHANDELING

Bij de IRE-behandeling plaatst de arts een aantal naalden in de prostaat. Hij doet dit via het gebied tussen de balzak en de anus: perineum. Daarna worden door de naalden heel korte elektrische stroomstoten gegeven. Hierdoor worden de kankercellen gedood. U krijgt voor deze behandeling een verdoving. De kans dat weefsels om de prostaat heen beschadigen door deze behandeling is klein. De kans op erectieproblemen na de ingreep is daardoor ook klein.

#### OVERIGE NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Patiënten met een agressievere vorm van prostaatkanker krijgen vaak inwendige bestraling met een iridiumbron in combinatie met uitwendige bestraling. Artsen onderzoeken of inwendige bestraling zonder uitwendige bestraling geschikt is voor patiënten met een minder agressieve vorm van prostaatkanker. Antihormonen kunnen zinvol zijn als de ziekte terugkeert nadat een patiënt eerder chemotherapie heeft gehad. Artsen onderzoeken het effect van deze medicijnen bij mensen die nog geen chemotherapie hebben gehad.

**PWF**

| Scharloeweg 52 |

| T: 461 1998 • 461 0108 |

| E: [info@spwfcuraao.org](mailto:info@spwfcuraao.org) |